

Гербалор при застуді

добавка дієтична

Гербалор при застуді – продукт у вигляді таблеток, що містять спеціально підібрані активні компоненти.

Вітамін С – сприяє нормальному функціонуванню імунної системи, що допомагає зменшити виснаження і втому організму. Підтримує імунітет та має антиоксидантні властивості.

Цинк – позитивно впливає на підвищення опірності організму під час застудних захворювань.

Рутин – стимулює імунну систему та підтримує організм під час вірусних інфекцій. Підвищує всмоктування вітаміну С.

Саліциламід – підтримує організм під час застудних захворювань, лихоманки, запалень, болю у горлі чи головного болю.

Склад, 1 таблетка, 300 мг: вітамін С (*аскорбінова кислота*), рутин, цинк, целюлоза мікрокристалічна, гідроксипропілцелюлоза, саліциламід, *кремнію діоксид, тальк, цукралоза, триацетин, титану діоксид, поліетиленгліколь, лецитин соєвий.

Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: білки – 0,37 г, вуглеводи – 90,38 г, жири – 0,12 г, цукри – 0,65 г. **Енергетична цінність (калорійність) на 100 г продукту:** 655,43 кДж (236,67 ккал).

Рекомендовано до раціону харчування як додаткове джерело біологічно активних речовин для підтримки імунітету при сезонних застудних захворюваннях та грипі. Допомагає підвищити імунний опір організму. Для застосування у якості допоміжної терапії при грипі, застуді, вірусних захворюваннях, які супроводжуються лихоманкою, болем у горлі та головним болем.

Вживати: по 1 таблетці 3 рази на добу.

Спосіб застосування: краще приймати під час їжі запиваючи невеликою кількістю води.

Термін вживання: протягом 3-5 днів, в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем.

Застереження при застосуванні.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.

Протипоказання.

Не використовувати, якщо у Вас спостерігалась підвищена чутливість до будь-якого із компонентів добавки. Продукт не повинен використовуватися в якості заміни повноцінного харчування. Не вживати під час вагітності чи годування груддю. Не використовувати дітям до 16 років. Не застосовувати при порушеннях кислотно-лужного балансу (цукровий діабет, уремія, судоми). Не вживати при загостренні виразкової хвороби шлунка або дванадцятипалої кишки. Не використовувати при серцевій недостатності, при порушеннях згортання крові.

Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі 25 °С.

Форма випуску: по 10 або 20 або 30 таблеток, вкритих плівковою оболонкою у блістерах в картонній коробці.

Маса нетто: 3 г (10 таблеток) або 6 г (20 таблеток) або 9 г (30 таблеток).

Без ГМО. Не є лікарським засобом.

Термін придатності: 2 роки.

Виготовлено: Фармацевтичний завод «Польфарма» С.А., вул. Пельплиньська 19, 83-200, Старогард Гданьски, Польща, тел.: + 48 22 364 61 00, факс: + 48 22 364 61 02.

Представництво виробника в Україні, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживачів та несе відповідальність за якість, безпеку продукту:

Представництво «Фармацевтичний завод “Польфарма” С.А.», 01004, м. Київ, вул. Горького, 7-В, тел.: (044) 498 90 07, факс: (044) 498 93 87, e-mail: uaoffice@polpharma.com.

Імпортери в Україні:

ТОВ «БадМ», 49005, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, тел. (056) 747 01 10;

ТОВ «Вента. ЛТД», 49000, м. Дніпро, Селянський узвіз, 3-А, тел. (056) 370 35 00;

СП «Оптіма-Фарм, ЛТД», 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А, тел. (044) 490 53 10;

ТОВ «ФРАМ КО», 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна, 114, тел. (044) 498-29-90;

ТОВ «Аметрін ФК», 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 26, тел. (057) 714-06-03.